

TREBON® 30EC

ROVARÖLŐ SZER

Általános információk

Hatóanyag	30% etofenprox
Forgalmazási kategória	II. kategória
Engedély száma	22683/1987, 04.2/1785-2/2015. 02.5/512/1/2008; 04.2/4488-1/2017
Formuláció	emulzióképző koncentrátum
Kiszerezés	1 liter, 5 liter
Eltarthatóság	3 év
Munka-egészségügyi várakozási idő	0 nap
Élmezés-egészségügyi várakozási idő	3-14 nap
Ökológiai gazdálkodásban engedélyezett	nem
Méh veszélyesség	kifelyezetten veszélyes
Tűz veszélyesség	tűz és robbanás veszélyes

- Felhasználható almatermésű kultúrákban, burgonyában és cukorrépában egyaránt
- Alacsony hőmérsékleten is tökéletes megoldás a kártevők ellen
- Egyedi molekula összetételének köszönhető, biztos hatás
- Kontakt és gyomorméreg



Felhasználható

Kultúra	Károsító	Dózis l/ha	é.v.i.
Almatermésűek alma, körte, birs	almamoly, aknázó molyok	0,5	14
Burgonya	burgonyabogár	0,5	3
Cukorrépa	lombrágó bagolypille lárvák	0,15-0,3	5

Munkaegészségügyi óvórendszabályok

Egyéni védőfelszerelés előkészítőknek és felhasználóknak: védőruha, védőkalap, védőkesztyű, sav elleni védőszemüveg. Óvatos munkával kerülni kell a szer elfolyását, elcsepegését, a permetlé, a permet, a tömény szer szembe bőrre jutását, belélegzését, esetleges lenyelését. Munka közben

gyakori kézmosás, munka végeztével alsó és felsőruha váltás, alapos tisztálkodás, zuhanyozás szükséges.

Mérgezéskor, vagy annak gyanújakor a munkát azonnal félbe kell szakítani, majd helyszíni elsősegélynyújtás után orvosi, intézeti ellátást kell biztosítani.

Előírt növényvédelmi technológia

Almatermésűek (alma, körte, birs)

Az almamoly és aknázómolyok ellen a kezelést előrejelzésre alapozva, a károsító rajzás csúcsideszakában kell elvégezni. Az előírt dózis: 0,5 liter/ hektár. Elhúzódó rajzás esetén, a védekezést meg kell ismételni. A kijuttatáshoz a gyümölcsösökben az ültetvény művelésmódjától, a lombkorona nagyságától, az alkalmazott géptípustól függően 300-1000 liter hektáronkénti vízmennyiség szükséges.

Burgonya

A burgonyabogár elleni védekezést a fiatal lárvák (L1, L2) tömeges megjelenésekor vagy a burgonyabogár imágók megjelenésekor kell elvégezni. A előírt dózis: 0,5 liter/hektár. A kijuttatáshoz, a lombzat nagyságától és a géptípustól függően 300-500 liter hektáronkénti vízmennyiség szükséges.

Cukorrépa

Hazánkban, számos bagolylepkéhernyő faj károsíthatja a cukorrépat. A bagolylepkék 2-3 nemzedékű fajok, melyek imágói nyáron és ősszel többször is rajzanak. A védekezést a lárvák tömeges megjelenésekor kell elvégezni. A előírt dózis: 0,15-0,3 liter/hektár. A magasabb dózis erős lárvafertőzés esetén előírt. A kijuttatáshoz, lombzat nagyságától és a géptípustól függően 300-500 liter hektáronkénti vízmennyiség szükséges.



Egyedi molekula összetételének köszönhetően biztos hatás



Trebon is a registered trademark of Mitsui Chemicals Agro, Inc. (Japan)
®= Mitsui Chemicals Agro, Inc. (Japan)
®1 = Spiess-Urania Chemicals GmbH